



Роды в домашних условиях это довольно серьезное решение. Каждая роженица в этом случае должна отдавать себе отчет, что вся ответственность лежит только на ней. Сейчас мы не будем говорить о преимуществах и недостатках домашних родов.

Если роженица приняла такое решение, значит, она учла все факторы. Очень важно учесть то, что может наступить такой момент, что вы пожалеете о своем решении, но уже будет невозможно что-нибудь сделать. Поэтому, желательно не один раз подумать об этом.

Довольно часто у рожениц при домашних родах наблюдается слабая родовая активность. Это может происходить из-за гипоксии плода, а также из-за его асфиксии, что может стать причиной как смерти ребенка, так и привести к тяжелым последствиям для роженицы. Также при домашних родах есть еще один фактор риска это преждевременное отслоение плаценты, которое также может стать причиной гипоксии или асфиксии плода, но большая опасность это маточное кровотечение. Как только проявятся первые отслоения плаценты, то есть появятся кровянистые выделения, необходимо моментально вызывать скорую помощь. Это процесс не стремительный, поэтому в вас есть время. При домашних родах около роженицы должна быть опытная акушерка. Только она, прослушав сердцебиение, может определить обвитие пуповиной ребенка еще до родов. Довольно часто во время рождения младенца обнаруживают обвитие пуповиной, и в этом случае необходимо быстро его снять с петли, и потом действовать по обстоятельствам.

Младенцам может, быть нужно будет делать или искусственное дыхание, или массаж грудной клетки. Опытная акушера даже знать все методы, и тогда она сможет вовремя помочь младенцу. Неполное отхождение плаценты может вызвать сильное кровотечение, и может потребовать оперативного вмешательства. В том случае, если роженица рождает самостоятельно, то она не сможет установить полностью ли вышла плацента. Это может определить только акушерка, и своевременно принять меры.