



Обширные исследования, проведенные в Нидерландах, показали, что домашние роды, если их сравнивать с родами в больницах, не несут никаких дополнительных рисков. Об этом сообщила BBC News, ссылаясь на «Международный журнал акушерства и гинекологии» (BJOG). Учеными был проведен анализ родов 530 тысяч рожениц. На основании этого анализа было сделано заключение, что уровень смертности младенцев и матерей практически не отличается при родах в больницах и дома.

Эта статистика была сделана на материале родов, риск которых первоначально оценивался как низкий, и при этом учитывались только те госпитальные роды, которые осуществлялись с помощью акушерки без серьезных вмешательств докторов. Эти исследования помогли опровергнуть тезис о том, что высокая смертность при родах в Нидерландах происходит из-за того, что значительная часть родов протекает в домашних условиях.

С 1988 года в Европе увеличивается число рожениц, которые хотят рожать в домашних условиях, и в наше время даже 3% англичанок, которые обычно настроены на роды в больнице, рожают дома.

Безопасное течение домашних родов обеспечивают высоко профессиональные акушерки, у которых есть возможность быстро отправить роженицу в больницу, если возникнут осложнения. Следует отметить, что даже, если приходилось роженицу транспортировать в больницу при домашних родах, все равно риск осложнений при этом не увеличивался, в сравнении со случаем, если бы роженица сразу же рожала в больнице. В статье журнала «Вокруг света» отмечалось, что

социально-экономические факторы, прежде всего изменение характера условий труда, все больше влияют на процессы рождаемости и продолжения рода. Такой фактор, как удобство медицинского персонала родильных отделений и оптимизация расходов клиник, влияет на рождаемость. Этот фактор стал превалировать в последние десятилетия, и он также оказал влияние на изменение частоты рождаемости в различные дни недели.